

POTILASOHJE

RADIOLOGIA

Eturauhasen magneettitutkimus

Prostatan magneettitutkimus

Olet saanut lähetteen magneettitutkimukseen. Tutustu esitietolomakkeeseen jo etukäteen. **Ota täytetty esitietolomake mukaasi.** Saapumisohjeessa on yhteystiedot, mikäli sinulla on kysyttävää.

Esivalmistelujen vuoksi saavu tutkimusyksikköön **noin 15 minuuttia ennen** sinulle varattua tutkimusaikaa.

Tutkimus kestää 30–60 minuuttia, joskus kiireelliset päivystystutkimukset aiheuttavat muutoksia tutkimusaikatauluun. Varaa aikaa tutkimuksessa käyntiin 2 tuntia.

Tutkimukseen valmistautuminen

Osta apteekista Toilax yhdistelmäpakkaus, joka sisältää 4 enterotablettia ja 1 pienoisperäsuspension.

Tutkimusta edeltävänä päivänä:

- Saat syödä ja juoda normaalisti. Ota lääkärin määräämät lääkkeet ohjeiden mukaan.
- Ota kaksi Toilax-tablettia kylmän nesteen kanssa aamulla ja toiset kaksi tablettia illalla.

Tutkimuspäivänä:

- Laita 3–4 tuntia ennen tutkimusta pienoisperäruiskesuspensio pakkauksen ohjeen mukaan.
- 4 tuntia ennen tutkimusta ole syömättä ja juomatta.
- Ota lääkärin määräämät lääkkeet ohjeiden mukaan.
- Älä laita mahdollista lääkelaastaria.
- Peräsuolen tulee olla tyhjä, jotta tutkimus onnistuu. Jos epäilet tyhjentymisen onnistumisesta, ilmoita siitä hoitajalle.
- Käy vielä ennen tutkimuksen aloitusta wc:ssä.

Korut ja lävistyskorut on poistettava ja ne on hyvä jättää kotiin.

Tutkimus

Magneettitutkimuksessa saadaan tarkkoja anatomisia kuvia ilman röntgensäteilyä. Kuvaus tapahtuu molemmista päistään avonaisessa, tunnelimaisessa laitteessa. Saattajan läsnäolo tutkimuhuoneessa on mahdollinen. Tutkimuksen aikana on merkinanto- ja puheyhteys tutkimusta tekevään hoitajaan.

Tutkimuksen onnistuminen edellyttää paikallaan pysymistä. Tutkimusasento pyritään saamaan mahdollisimman mukavaksi.

Tutkimuksen aikana kuuluu melko voimakasta ääntä, minkä vuoksi sinulle annetaan kuulosuojaimet. Kuulosuojainten kautta saatetaan antaa tutkimuksen aikana hengitysohjeita. Hengityspidätykset kestävät n. 10–20 sekuntia kerrallaan.

Musiikin kuuntelu on mahdollista suuressa osassa tutkimuksia. Voit ottaa mukaasi oman CD-levyn.

Tutkimuksen aikana ruiskutetaan laskimoon suolistoa rentouttavaa lääkettä sekä tarvittaessa magneettitehosteainetta, joka ei sisällä jodia. Tehosteaine poistuu virtsan mukana.

Tutkimuksen jälkeen

Tutkimus ei vaadi jälkihoitoa.

Tutkimuksen tuloksen kuulet sinua hoitavalta lääkäriltä. Ota yhteyttä hoitavaan yksikköön, jos sinulla ei ole tiedossa vastaanotto- tai soittoaikaa.

Muuta huomioitavaa

Ota mukaasi Kela- tai henkilökortti.

Peruuttamatta jääneestä ajanvarauksesta perimme sinulta maksun.