

POTILASOHJE

HYKS Iho- ja Allergiasairaala
Allergiatutkimuskeskus yksikkö sijaitsee 2. kerroksessa (pääoven aulasta 1 kerros alaspäin),

Ihopistokoe eli Prick-testi

Ihopistokoe on lähes kivuton välittömän allergian perustutkimus ja se voidaan tehdä kaikenikäisille potilaille. Yhdellä testikerralla voidaan tutkia samanaikaisesti suuri joukko allergeeneja ja tulos on nähtävissä 15 minuutin kuluttua.

Ennen testiin tuloa otettava huomioon:

Luotettavan tuloksen saamiseksi ei saa käyttää antihistamiini- tai matkapahoinvointilääkkeitä **5 vuorokautta** ennen testipäivää.

Yleisimmin käytettyjä testiä haittaavia lääkevalmisteita ovat

Aerinaze	Dasselta	Kestox	Postafen
Aerius	Desloratadine	Lastin	Revitelle
Alzyr	Diphenhydramin, Dormix	Levazyr	Rinexin
Atarax	Duact	Levocetirizin	Theralene
Atosil	Dymista	Livostin	Telfast
Benadryl	Emadine	Loratadin	Tuulix
Cetimax	Fexorin	Marzine	Xyzal
Cetirizin	Heinix	Nefoxef	Zaditen
Cirrus	Histadin	Nocedan	Zyrtec
Clarityn	Histec	Opatanol	
Cyclizine	Hydroxyzine	Pafinur	
Codesan comp.	Kestine	Peritol	

Muuta huomioitavaa

Mikäli käytössä on kortisonitablettilääkitys, joka on enemmän kuin 20 mg vuorokaudessa, ottakaa yhteys allergiatutkimuskeskukseen.

Hengittävät astmalääkkeet eivät vaikuta testitulokseen. Silmätipat ja nenäsuihkeet, jotka eivät sisällä antihistamiinia, eivät vaikuta testitulokseen. (Huom! ylläoleva lista)

Ihopistokoe tehdään terveelle iholle.

Ei voiteiden käyttöä käsivarsiin edellisenä iltana eikä testipäivänä.

Lisätietoja antaa tarvittaessa Allergiatutkimuskeskus, puh. 09 471 86200
ma-to klo 7:45-15:00, pe klo 7:45-13.30