

## Arteriovenöösien malformaation (AVM) embolisaatio

Olet saanut lähetteen valtimo-laskimo epämuodostuman tukkimishoitoon eli embolisaatioon.

Tutkimus kestää noin 1–4 tuntia.

### Toimenpiteeseen valmistautuminen

**Jos olet yliherkkä puudutusaineelle tai jodipitoiselle varjoaineelle tai olet / epäilet olevasi raskaana**, kerro siitä lähtevälle lääkärille tai röntgenhoitajalle ennen tutkimusta.

- Ole syömättä, juomatta ja tupakoimatta vähintään toimenpidettä edeltävänä yönä klo 24 alkaen.
- Käy suihkussa tutkimuspäivän aamuna.
- Ota lääkärin määräämät lääkkeet normaalisti. Jos sinulla on verenohennuslääkitys tai insuliinihoitoinen diabetes, hoitava yksikkö antaa sinulle lääkityksestä erillisen ohjeen.

### Toimenpide

Tulet aamulla joko osastolle tai röntgenin valvontaan tutkimusta varten. Vaihdat sairaalan vaatteet ja tarvittaessa saat esilääkkeen.

Tutkimuksen aikana olet selinmakuulla tutkimuspöydällä. Sinulle kerrotaan tutkimuksen etenemisestä.

Tutkimuksen aikana olet nukutuksessa. Tutkimus tehdään yleensä nivustaipen valtimon kautta. Verisuoneen laitetaan kuvauskatetri, josta ruiskutetaan varjoainetta ja hoitavaa lääkeainetta.

### Toimenpiteen jälkeen

Kun toimenpide on valmis, suljetaan verisuoneen tehty reikä. Tarvittaessa pistokohtaa tuetaan painopussilla. Seuraavaksi sinut siirretään heräämöhön.

Toimenpiteen jälkeen tulee olla 2–6 tuntia vuoteessa. Vuodelevon jälkeen on hyvä lepuilla seuraavaan aamuun, wc:ssä voi käydä. Toimenpiteen jälkeen saat syödä ja juoda vointisi mukaan normaalisti.

Ponnistelua on syytä välttää neljän päivän ajan. Saunomista ja kylpemistä tulee välttää viikon ajan, suihkussa voi käydä toimenpiteen jälkeisenä päivänä. Jälkihoidosta saat ohjeet röntgenosastolta.

Jos tulet toimenpiteeseen vuodeosastolta, pääset yleensä kotiin toimenpidettä seuraavana päivänä.

Lääkäri kirjoittaa tarvittaessa sairauslomatuodistuksen.

### Ota huomioon

Ota mukaasi Kela- tai henkilökortti.

Peruuttamatta jääneestä ajanvarauksesta perimme sinulta maksun.