

Kiveskohjun tukkiminen

Olet saanut lähetteen kiveskohjun tukkimiseen eli embolisaatioon. Toimenpiteen kesto on yleensä 1–2 tuntia, lisäksi jälkihoito 2–3 tuntia

Toimenpiteeseen valmistautuminen

Jos olet yliherkkä puudutusaineelle tai jodipitoiselle varjoaineelle, kerro siitä lähettävälle lääkärille tai röntgenhoitajalle ennen tutkimusta.

- Ole syömättä ja juomatta vähintään 2 tuntia ennen tutkimusta.
- Ota mukaan eväät.
- Käy suihkussa tutkimuspäivän aamuna.
- Älä tule tutkimukseen omalla autolla.

Lääkärin määräämät lääkkeet saat ottaa normaalisti. Jos käytät verenohennuslääkitystä, noudata tauotuksessa hoitavan yksikön antamaa ohjetta.

Toimenpide

Tutkimuksen aikana olet selinmakuulla tutkimuspöydällä. Sinulle kerrotaan tutkimuksen etenemisestä.

Tutkimus tehdään nivustaipeen laskimon kautta paikallispuudutuksessa. Laskimoon laitetaan kuvauskatetri, ruiskutetaan varjoainetta ja otetaan röntgenkuvia. Hoitotoimenpiteessä katetri viedään kiveslaskimoon ja laskimo tukitaan metallilankakierukoilla ja tukkivalla lääkeaineella.

Toimenpiteeseen saattaa liittyä kivuntunnetta, johon saat tarvittaessa kipulääkettä.

Toimenpiteen jälkeen

Kun toimenpide on valmis, suljetaan verisuoneen tehty reikä käsin painamalla. Toimenpiteen jälkeen olet vuodelevossa 2–3 tuntia. Jatkohoidosta saat ohjeet röntgenistä. Kotiin pääset toimenpidepäivänä.

Tutkimuksen jälkeen saat syödä ja juoda normaalisti.

Tutkimuksen tuloksen kuulet sinua hoitavalta urologilta. Hän käy katsomassa sinua toimenpiteen jälkeen ja määrittää tarvittaessa sairausloman pituuden.

Ota huomioon

Ota mukaasi Kela- tai henkilökortti.

Peruuttamatta jääneestä ajanvarauksesta perimme sinulta maksun.