

Laskimomalformaation skleroterapia

Olet saanut lähetteen laskimoepämuodostuman skleroterapiaan.

Tutkimuksen kesto on yleensä 0,5–1 tuntia ja jälkihoito 0,5–2 tuntia.

Tutkimukseen valmistautuminen

Jos olet yliherkkä puudutusaineelle tai jodipitoiselle varjoaineelle tai olet / epäilet olevasi raskaana, kerro siitä lähetävälle lääkärille tai röntgenhoitajalle ennen tutkimusta.

- Ole syömättä, juomatta ja tupakoimatta vähintään 2 tuntia ennen tutkimusta.
- Käy suihkussa tutkimuspäivän aamuna.
- Ota tukisukka/tukihaha mukaan.
- Varaudu siihen, ettet voi mahdollisen lääkityksen vuoksi ajaa autolla tutkimuksen jälkeen 6 tuntiin.

Tutkimus

Ennen tutkimusta vaihdat sairaalan vaatteet. Käden laskimoon laitetaan kanyyli.

Aluksi katsotaan ultraäänellä hoidettavaa kohdetta ja päätetään hoitoasento. Sinulle kerrotaan tutkimuksen etenemisestä.

Tutkimus tehdään paikallispuudutuksessa. Verisuoneen laitetaan ohut neula, josta ruiskutetaan varjoainetta ja hoitavaa lääkeainetta. Tutkimukseen voi liittyä kipua, johon saat kipulääkettä.

Tutkimuksen jälkeen

Kun tutkimus on valmis, menet lepäämään röntgenosaston valvontaan. Lääkäri kirjoittaa tarvittaessa sairauslomatodistuksen. Jälkihoidosta saat tarkemmat ohjeet röntgenosastolta.

Tutkimuksen jälkeen saat syödä ja juoda vointisi mukaan normaalisti.

Ota huomioon

Ota mukaasi Kela- tai henkilökortti.

Peruuttamatta jääneestä ajanvarauksesta perimme sinulta maksun.