

## Lymfaattisen malformaation skleroterapia

Olet saanut lähetteen imusuonten epämuodostuman skleroterapiaan

Toimenpiteen kesto on yleensä 0,5–1 tuntia ja jälkihoito 0,5–2 tuntia

### Toimenpiteeseen valmistautuminen

**Jos olet yliherkkä puudutusaineelle tai jodipitoiselle varjoaineelle tai olet / epäilet olevasi raskaana**, kerro siitä lähetävälle lääkärille tai röntgenhoitajalle ennen toimenpidettä.

- Ole syömättä, juomatta ja tupakoimatta vähintään 2 tuntia ennen toimenpidettä.
- Käy suihkussa toimenpidepäivän aamuna.
- Ota lääkärin määräämät lääkkeet normaalisti.
- Varaudu siihen, ettet voi ajaa autoa toimenpiteen jälkeen 6 tuntiin.

### Toimenpide

Ennen toimenpidettä vaihdat sairaalan vaatteet. Käden laskimoon laitetaan kanyyli.

Aluksi katsotaan ultraäänellä hoidettavaa kohdetta ja päätetään hoitoasento. Sinulle kerrotaan toimenpiteen etenemisestä.

Toimenpide tehdään paikallispuudutuksessa. Imusuoneen laitetaan ohut neula, josta ruiskutetaan varjoainetta ja hoitavaa lääkeainetta. Toimenpiteeseen voi liittyä kipua, johon saat kipulääkettä

### Toimenpiteen jälkeen

Kun toimenpide on valmis, menet lepäämään röntgenosaston valvontaan. Lääkäri kirjoittaa tarvittaessa sairauslomatodistuksen. Jälkihoitosta saat tarkemmat ohjeet röntgenosastolta.

Tutkimuksen jälkeen saat syödä ja juoda vointisi mukaan normaalisti.

### Ota huomioon

Ota mukaasi Kela- tai henkilökortti.

Peruuttamatta jääneestä ajanvarauksesta perimme sinulta maksun.