

Ohutsuolen tietokonetomografia

TT-enterografia

Olet saanut lähetteen ohutsuolen tietokonetomografiatutkimukseen. Hoitava yksikkö antaa tiedot kuvauspaikasta ja -ajasta.

Tule röntgenosastolle 1 tuntia ennen tutkimusaikaa esivalmistelujen takia. Tutkimus kestää noin 15 minuuttia, mutta varjoaineen juomiseen tulee varata aikaa. Joskus kiireelliset päivystystutkimukset aiheuttavat muutoksia tutkimusaikatauluun.

Tutkimukseen valmistautuminen

Tutkimuspäivänä sinun tulee olla syömättä.

Saat juoda vettä, kahvia, teetä, kirkasta liha/kasvislientä, hapottomia virvoitusjuomia ja mehuja.

Et saa juoda hedelmän sakkaa sisältäviä tuoremehuja, olutta, maitoa tai piimää. Ota lääkärin määräämät lääkkeet ohjeen mukaan.

Jos olet yliherkkä jodipitoiselle varjoaineelle tai olet / epäilet olevasi raskaana, kerro siitä hoitavalle lääkärille tai röntgenhoitajalle ennen tutkimusta.

Jos olet peritoneaalidialyysipotilas, tyhjennä dialyysineste pois vatsaontelosta kuvauksen ajaksi.

Tutkimus

Ennen tutkimusta sinun tulee juoda 45 min ajan varjoainetta, jonka saat röntgenistä. Varjoaine ei sisällä jodia. Tarkoituksena on saada koko ohutsuoli täyttymään liuoksella.

Tietokonetomografiatutkimuksessa muodostuu kohteesta röntgensäteiden avulla leikekuvia. Tutkimus on kivuton. Tutkimuksen aikana sinun tulee maata liikkumatta, koska liike aiheuttaa kuviin epätarkkuutta. Röntgenhoitajalla on sinuun puhe-, kuulo- ja näköyhteys.

Kuvauksen yhteydessä annetaan jodipitoista varjoainetta käden laskimoon. Varjoaine parantaa verisuonten ja eri kudosten näkyvyyttä. Varjoaine aiheuttaa ohimenevän lämmöntunteen ja ehkä metallin maun. Varjoaine poistuu elimistöstä virtsaan.

Tutkimuksen jälkeen

Röntgenissä juotava varjoaine saattaa aiheuttaa hetkellistä ripulia.

Tutkimuksen tuloksen kuulet sinua hoitavalta lääkäriltä. Ota yhteyttä hoitavaan yksikköön, mikäli sinulla ei ole tiedossa vastaanotto- tai soittoaikaa.

Muuta huomioitavaa

Ota mukaasi Kela- tai henkilökortti.

Peruuttamatta jääneestä ajanvarauksesta perimme sinulta maksun.