

Peräsuolen sauman varjoainetehosteinen TT-kuvaus

Olet saanut lähetteen tietokonetomografia-tutkimukseen. Hoitava yksikkö antaa tiedot kuvauspaikasta ja ajasta.

Tutkimus kestää noin 15 minuuttia joskus kiireelliset päivystystutkimukset aiheuttavat muutoksia tutkimusaikatauluun.

Varaa tutkimuksessa käyntiin aikaa 1 tunti.

Tutkimukseen valmistautuminen

- Ole syömättä 2 tuntia ennen tutkimusta.
- Nesteitä (vettä tai mehua) on hyvä juoda tutkimuksen alkamiseen saakka.
- Ota lääkärin määräämät lääkkeet ohjeen mukaan.

Jos olet yliherkkä jodipitoiselle varjoaineelle tai olet / epäilet olevasi raskaana, kerro siitä hoitavalle lääkärille tai röntgenhoitajalle ennen tutkimusta.

Jos olet peritoneaalidialyysipotilas, tyhjennä dialyysineste pois vatsaontelosta kuvauksen ajaksi.

Tutkimus

Tietokonetomografiatutkimus perustuu röntgensäteilyyn.

Tutkimuksen aikana sinun tulee maata liikkumatta, koska liike aiheuttaa kuviin epätarkkuutta. Röntgenhoitajalla on sinuun puhe-, kuulo- ja näköyhteys.

Peräsuolen sauman TT-tutkimuksessa sinulle laitetaan kuvauspöydällä jodipitoista varjoaineliuosta peräsuoleen ohuen kärjen avulla. Varjoaineen avulla tarkastetaan, onko suolisauma ehjä.

Usein annetaan jodipitoista varjoainetta myös käden laskimoon. Laskimonsisäinen varjoaine parantaa verisuonten ja eri kudosten näkyvyyttä. Varjoaine aiheuttaa ohimenevän lämmöntunteen ja joskus metallin maun. Varjoaine poistuu elimistöstä virtsaan.

Tutkimuksen jälkeen

Varjoaine ei ole este autolla ajamiselle tai työhön takaisin palaamiselle.

Tutkimusvastauksen saat hoitavalta yksiköltä. Tarvittaessa ota yhteyttä sinua hoitavaan yksikköön

Muuta huomioitavaa

Ota mukaasi Kela- tai henkilökortti.

Peruuttamatta jääneestä ajanvarauksesta perimme sinulta maksun.