

Kontrastundersökning av avföringsfunktionen vid Hyvinge sjukhus

Defekografi

Du har fått en remiss för en kontrastundersökning av avföringsfunktionen. Information om undersökningsstället och -tiden får du av vårdenheten. Undersökningen kräver en tidsbeställning.

Du bör anmäla dig, **2 timmar före undersökningen** för att dricka kontrastmedel. Reservera cirka 3 timmar för undersökningen. Avbildningen tar cirka 30 minuter. På röntgenavdelningen undersöks också jour-patienter, vilket kan förlänga väntetiden.

Förberedelse för undersökningen

Om du vet eller misstänker att du är gravid ska du helst kontakta er vårdenhet på förhand eller personalen på röntgenavdelningen senast före undersökningen.

Läkarordinerande mediciner ska tas normalt.

Köp 4 burkar Colonsteril-granulat på apoteket.

Dagen före undersökningen:

- Du ät och drick rikligt med flytande föda och vätska, så som vatten, te, kaffe, silad saftsoppa eller kräm samt silad kött-, fisk- eller hönsbuljong och saft samt juice som inte innehåller fruktkött.
- Ät och drick ingen mjölk eller mjölkprodukter.

- Kl. 16 dricka Colonsteril-vätska cirka en liter per timme. Bered lösningen så, att du blandar en burk granulat med en liter vatten, tillsammans 4 liter. Det är behagligare att dricka lösningen som kylskåpskall.
- Tillfälligt illamående, svullnad av magen eller magkramp kan förekomma. Mot illamående hjälper det att dricka långsammare. Tarmen börjar fungera efter en timme att du har börjat att dricka. Motionen gör tömningen snabbare.

Du får dricka klara safter, högst ½ liter. Du kan också suga på pastiller för att underlätta drickandet.

Samma dag som undersökningen:

- På morgonen får du inte äta någon föda, vatten får du dricka.
- Inom 2 timmar före undersökningen får du inte dricka.

Undersökning

Två timmar före undersökningen får du, på röntgenavdelningen, dricka kontrastmedel för att markera tunntarmen. Undertiden går kvinnorna till polikliniken för kvinnosjukdomar, för att för undersökningen få in satt en tampong blött i jodhaltigt kontrastmedel. Ändtarmen fylls med kontrastmedel på undersökningsbordet. Avföringsfunktionen avbildas när du sitter på ett kärlet.

Efter undersökningen

- Inled födointaget försiktigt efter tömningen

Undersökningsresultatet får du av den behandlade läkaren. Om du inte har fått en mottagningstid eller telefontid, kontakta den vårdande enheten.

Annat att beakta

Ta med dig FPA-kort eller identitetskort.

Om du har bilder och utlåtanden från röntgenundersökningar som gjorts annanstans än vid HUS från området i fråga, ta med dem då du kommer till undersökningen. Bilder och utlåtanden från tidigare röntgenundersökningar som gjorts vid HUS finns i arkivet.

Om inte den reserverade undersökningen annulleras uppbärs en separat straffavgift.