

Avlägsnande av vätska från bukhålan under ultraljudsledning

Du har fått en remiss till ingreppet.

Ingreppet tar vanligen cirka 30 minuter. En patient som behöver en brådskande undersökning kan tas in före dig.

Efter ingreppet får du vila på avdelningen eller polikliniken på sjukhuset.

Om du har några frågor angående ingreppet finns kontaktuppgifter i ankomsanvisningen eller i kallelsebrevet.

Före ingreppet

- Ta läkemedlen som läkaren ordinerat enligt anvisning.
- Ät inte 3 timmar innan ingreppet.

Om **du har blodförtunnande medicinering**, ger din behandlande läkare

- anvisningar om hur du ska ta läkemedlen och
- en remiss till laboratorieundersökning.

Under ingreppet

Under ingreppet ska du klä av dig så att det undersökta området är bart och du får ligga på undersökningsbritten.

Röntgenläkaren lägger en gel på området som ska undersökas och för ultraljudsgivaren på huden.

Röntgenläkaren bedövar stickstället och avlägsnar därefter vätskan från bukhålan.

I bukhålan insätts vanligtvis en tunn plastslang genom vilken vätskan rinner i en uppsamlingspåse.

Om man tar ett prov på vätskan skickas den för undersökning till laboratoriet.

Efter ingreppet

- Efter ingreppet förs du till avdelningen eller polikliniken på sjukhuset där du ska vila i sängen. Läkaren på avdelningen eller polikliniken ger anvisningar om den fortsatta vården.
- Du får ingrepp resultaten av läkaren som vårdar dig.
- Om du inte vet hur du får resultaten, fråga polikliniken eller avdelningen som skickade dig till ingreppet.

Observera

- Ta med dig FPA-kort eller identitetsbevis.
- Inga separata avgifter tillkommer för ingreppet.
- Om inte den reserverade undersökningen annulleras uppbärs en separat straffavgift.

Mer information

Läs mer på internet

www.undersokningshuset.fi >> Olika
undersökningar >> Ultraljud

Titta på videor om undersökningar:
www.youtube.com >> Tutkimukset
minuutissa: Ultraääni