

Täppa till åderbräck av pungen

Du har fått en remiss för att täppa till ett pungbräck, dvs. embolisering.

Åtgärden tar i regel 1–2 timmar och eftervården ytterligare 2–3 timmar.

Om du har några frågor angående åtgärden finns kontaktuppgifter i ankomsanvisningen eller i kallelsebrevet.

Före åtgärd

Om du är överkänslig för bedövningsmedel eller jodhaltigt kontrastmedel, ska du informera den remitterande läkaren eller röntgenskötaren om detta före åtgärden.

- Du ska vara utan att äta minst 2 timmar före åtgärden.
- Ta med dig mellanmål.
- Ta en dusch på morgonen samma dag som åtgärden ska genomföras.
- Du skall inte komma till åtgärden med egen bil.

Läkarordinerade mediciner får intas som normalt.

Om du använder blodförtunnande medel, iaktta den vårdande enhetens anvisning om paus i behandlingen.

Under åtgärd

Medan åtgärden pågår ligger du på rygg på undersökningsbordet.

Du får information om hur åtgärden framskrider.

Åtgärden utförs i lokalbedövning via en ven i ljumskvecket.

En röntgenkateter förs in i venen, kontrastmedel injiceras och röntgenbilder tas.

Vid behandlingsåtgärden förs en kateter in i testikelvenen, venen täpps till med metalltrådspiraler och blockerande läkemedel.

Åtgärden kan medföra smärta mot vilken du vid behov får smärtstillande läkemedel.

Efter åtgärd

När åtgärden har avslutats, sluts det hål som har gjorts i blodådern genom att med handen trycka på punktionsstället.

Efter åtgärden ligger du kvar i sängläge 2–3 timmar.

På röntgen får du anvisningar för fortsatt vård.

Du får åka hem på åtgärdsdagen.

Efter åtgärden får du äta och dricka normalt.

Den behandlande urologen informerar dig om undersökningsresultatet. Urologen tittar till dig efter åtgärden och vid behov fastställer längden på sjukledigheten.

Patientanvisning
HUS Bilddiagnostik
Radiologi

2 (2)

undersokningshuset.fi

Annat att beakta

Ta med dig FPA-kort eller identitetsbevis.

Avboka tiden om du inte kan komma.

Om du inte avbokar tiden kommer du att debiteras en straffavgift.