

Ohutsuolen magneettitutkimus lapselle

Lapsesi on saanut lähetteen magneettitutkimukseen.

Tutustu esitietolomakkeeseen etukäteen. Ota täytetty esitietolomake mukaasi.

Tule esivalmistelujen vuoksi yksikköön 1 tunti ennen varsinaista tutkimusaikaa.

Varaa tutkimuksessa käyntiin aikaa 3 tuntia. Tutkimus kestää noin 30 minuuttia. Potilas, joka tarvitsee kiireellistä tutkimusta, voi päästä tutkimukseen ennen lastasi.

Saapumisohejeessa tai ajanvarauskirjeessä on yhteystiedot, jos sinulla on kysyttävää tutkimuksesta.

Ennen tutkimusta

Mahdollinen rautatablettilääkitys on lopetettava vähintään 5 päivää ennen tutkimusta.

Tutkimusta edeltävänä päivänä

- Saa syödä vähärasvaista ja vähäkuituista ruokaa: vaaleaa leipää, mehukeittoa, perunaa, vähärasvaista kalaa ja kanaa.
- Ei saa syödä lihaa, kasviksia, hedelmiä, puuroa, täysjyväleipää, voita eikä juoda maitoa.
- Klo 16 on otettava 2 suolistoa tyhjentävää Toilax-tablettia veden kanssa.

Tämän jälkeen voi vielä syödä edellä mainitun ruokavalion mukaisesti. Tyhjennysaineet saat joko lähettävästä yksiköstä tai ostat apteekista.

Tutkimuspäivänä

- Ei saa syödä.
- Aamulla tulee juoda 1–2 lasia vettä.
- Lääkärin määräämät lääkkeet saa ottaa.
- Älä laita lapselle mahdollista lääkelaaastaria.

Korut ja lävistyskorut on poistettava ja ne on hyvä jättää kotiin.

Tutkimuksen aikana

50 minuuttia ennen tutkimusta aletaan juoda ohutsuolta täyttävää nestettä ja käden laskimoon laitetaan kanyyli.

Magneettitutkimuksessa saadaan tarkkoja anatomisia kuvia ilman röntgensäteilyä. Kuvaus tapahtuu molemmista päistään avonaisessa, tunnelimaisessa laitteessa. Saattajan läsnäolo tutkimuhuoneessa on mahdollinen. Tutkimuksen aikana on merkinanto- ja puheyhteys tutkimusta tekevään hoitajaan.

Tutkimuksen onnistuminen edellyttää paikallaan pysymistä. Tutkimus tehdään vatsallaan maaten ja asento pyritään saamaan mahdollisimman mukavaksi.

Tutkimuksen aikana kuuluu melko voimakasta ääntä, minkä vuoksi laitetaan korvatulpat ja kuulosuojaimet. Kuulosuojainten kautta annetaan tutkimuksen aikana hengitysohjeita.

Hengityspidätykset kestävät n. 10–20 sekuntia kerrallaan. Hengityspidätyksiä on hyvä harjoitella ennen tutkimukseen tuloa.

Tutkimuksen alussa ruiskutetaan suolistoa rentouttavaa lääkettä laskimoon. Tutkimuksen aikana annetaan laskimoon magneettitehosteainetta, joka ei sisällä jodia. Tehosteaine poistuu virtsan mukana.

Tutkimuksen jälkeen

Tutkimus ei vaadi jälkihoitoa. Tutkimuksen jälkeen saattaa esiintyä ohimenevää ripulia.

Tutkimuksen tuloksen kuulet lasta hoitavalta lääkäriltä.

Ota yhteyttä lasta hoitavaan yksikköön, mikäli sinulla ei ole tiedossa vastaanotto- tai soittoaikaa.

Ota huomioon

Ota mukaasi Kela-kortti tai henkilötodistus.

Tutkimuksesta ei tule erillistä maksua.

Peru aika, jos et pääse tulemaan.

Jos et peru aikaa, sinulta peritään sakkomaksu.

Lisätietoa

Lue lisää internetistä [tutkimukseen.fi](https://www.tutkimukseen.fi) >> Eri tutkimuksia >> Magneettitutkimus

Katso video [youtube.com](https://www.youtube.com) >> Tutkimukset minuutissa: Magneettitutkimus.