

Ulostustapahtuman varjoainetutkimus Kymenlaakson keskussairaalassa

Tutkimuksella selvitetään peräsuolen toimintaa ja lantion pohjan mahdollista laskeutumista, kun ulostat.

Tutkimus voidaan tehdä, jos henkilöllä

- on vaikeuksia ulostaa,
- on tunne, että peräsuoli tyhjenee huonosti tai
- peräsuoli luiskahtaa ulos.

Tutkimus tehdään röntgensäteitä käyttäen läpivalaisutekniikalla.

Tule röntgenosastolle 1 tunti ennen tutkimusaikaa.

Varaa tutkimuksessa käyntiin aikaa 3–4 tuntia.

Tutkimus kestää noin 30 minuuttia.

Ajanvarauskirjeessä on yhteystiedot, jos sinulla on kysyttävää tutkimuksesta.

Ennen tutkimusta

Jos olet raskaana tai epäilet olevasi raskaana, ota yhteyttä siihen poliklinikkaan tai osastoon, josta sinut lähetettiin tutkimukseen.

Raskaana olevia ei kuvata.

- Ennen tutkimusta voit syödä ja juoda normaalisti.
- Ota lääkärin määräämät lääkkeet normaalisti.

Tutkimuksen aikana

Kun tulet röntgeniin, saat juotavaksi varjoainetta 1 tunti ennen kuvausta.

Itse tutkimuksessa laitetaan varjoainetta peräukon kautta peräsuoleen. Sen aikaa makaat tutkimuspöydällä kyljellään.

Kun varjoaine on laitettu, röntgenlääkäri ottaa röntgenkuvia.

Kuvat otetaan, kun istut astialla.

Kuvia otetaan istuessa, kun ponnistat ja kun ulostat.

Tutkimuksen jälkeen

- Voit syödä normaalisti.
- Juo tavallista enemmän.
- Varjoaine voi värjätä ulosteen valkoiseksi.

Saat tutkimuksen vastaukset lääkäriltä, joka hoitaa sinua.

Jos et tiedä, kuinka saat vastaukset, kysy siltä poliklinikalta tai osastolta, josta sinut lähetettiin tutkimukseen.

Ota huomioon

Ota mukaasi Kela-kortti tai henkilötodistus.

Jos sinulla on CD-levyllä samalta kuvattavalta alueelta aiempia röntgenkuvia, ota CD-levy mukaasi.

Tutkimuksesta ei tule erillistä maksua.

Peru aika, jos et pääse tulemaan.

Jos et peru aikaa, sinulta peritään sakkomaksu.