

## TAKROLIMUUSILLA (Prograf® tai Adport®) HOIDETTAVAN MUNUAISSIIRTOPOTILAAN LÄÄKITYS

### Ennen leikkausta:

Anestesia­lääkärin määräämät esilääkkeet sekä

- **Takrolimuusi:** (Prograf® tai Adport®) 0.08mg/kg per os
- **Mykofenolaatti (CellCept®)** 500mg per os
- **Somac®** 40mg per os

### Leikkaussalissa:

Anestesia­induktiossa

- **Solu-Medrol** 125 mg iv
- **Zinacef** 1.5g iv

Harkituissa erityisindikaatioissa induktiohoito (esim. korkeasti immunisoituneet potilaat - **varmista aina kirurgilta!!**)

- **Simulect®** 20 mg iv tai
- **Grafalon®** 8 mg/kg iv (4-6h infuusio)

Ennen munuaisen verenkierron kytkemistä (kun munuainen pöydälle)

- **Mannitol** 15% 200 ml
- **Solu-Medrol** 125mg iv

### Heräämössä/osastolla

6 tuntia verenkierron kytk. jälkeen  
12 tuntia leikkauksen alkamisesta

- Solu-Medrol** 40mg iv
- Zinacef** 750mg iv

| MEDROL | Postop vrk | annos     |
|--------|------------|-----------|
|        | 1          | 125 mg iv |
|        | 1-14       | 16 mg po  |
|        | 15-28      | 12 mg po  |

**PROGRAF** 1. Postop vrk 0.04mg/kg x 2 (Huom! annos pitoisuuden mukaan)

| Postop vrk | B-Tacro µg/l |
|------------|--------------|
| 1-90       | 7-10 µg/l    |

**CELLCEPT** 1. postop vrk lähtien 500mg x 2

Verinäytteet 1. POP aamuna KIDLAAJA + B-TacroMS (21622)