

Candida auris (C.auris)

	C. auris-kantaja	C. auris-altistunut	Muu riski C. auris-kantajuudelle
Määritelmä	- Hälytysjärjestelmässä on tieto C. auris-kantajuudesta - Kliinisestä näytteestä tai seulontanäytteestä löytyy C. auris	- Hälytysjärjestelmässä on tieto C. auris-altistuksesta - Epidemiaepäilyissä / epidemiatilanteessa näytteenotto ja kosketusvarotoimet ohjeistetaan erikseen	Suora sairaalasiirto ulkomailta: Ulkomaat - Lähetteessä tieto riskistä
Varotoimet	Kosketusvarotoimien lisäksi kädet pestään vedellä ja saippualla aina potilashuoneesta poistuttaessa (sekä myöskin potilashuoneessa käsinien vaihdon yhteydessä ennen aseptista toimenpidettä); pesun jälkeen kädet desinfioidaan alkoholihuuhteella.	Kosketusvarotoimien lisäksi kädet pestään vedellä ja saippualla aina potilashuoneesta poistuttaessa (sekä myöskin potilashuoneessa käsinien vaihdon yhteydessä ennen aseptista toimenpidettä); pesun jälkeen kädet desinfioidaan alkoholihuuhteella. Voimassa kunnes kantajuus on pois suljettu.	Kosketusvarotoimien lisäksi kädet pestään vedellä ja saippualla aina potilashuoneesta poistuttaessa (sekä myöskin potilashuoneessa käsinien vaihdon yhteydessä ennen aseptista toimenpidettä); pesun jälkeen kädet desinfioidaan alkoholihuuhteella. Voimassa kunnes kantajuus on pois suljettu.
Potilaan sijoittelu	1-hengen huone C. auris –kantaja ei sovellu tilaeristyksessä hoidettavaksi - Huoneen varustelu yhdessä hygieniahoitajan kanssa; mahdollisimman vähän tavaroita huoneeseen, pyritään käyttämään kertakäyttötuotteita.	1-hengen huone Jos 1 hh ei käytettävissä, tilavarotoimet ja virka-aikana yhteys hygieniahoitajaan potilaan sijoittelusta	1-hengen huone Jos 1 hh ei käytettävissä, tilavarotoimet ja virka-aikana yhteys hygieniahoitajaan potilaan sijoittelusta
C. auris-näytteet (CaauVi 21786)	Yhdet seulontanäytteet jos edellisistä positiivista seulontanäytteestä on yli kuu-kausi	- Kahdet seulontanäytteet peräkkäisinä päivinä - Polikl. potilaasta voidaan ottaa kahdet seulontanäytteet samalla käynnillä	Kahdet seulontanäytteet peräkkäisinä päivinä
Näytteenottokohdat	- Kainalat (yhdellä tikulla näyte kummastakin kainalosta) - Nivuset (yhdellä tikulla näyte kummastakin nivusesta) - Nielunäyte; jos keinoilmatie, nielunäytteen sijasta näyte trakealimasta - Rektum - Jos haavoja, näyte erittävimmästä haavasta - Jos virtsakatetri on ollut yli viikon, katetrivirtsa		
Hälytystiedon purku	Jos näytteet negatiiviset, yhteys hygieniahoitajaan		
Siivous	Siivous eri varotoimiluokissa		

Candida auris -lisätietoa

Mikä on Candida auris?	Candida auris (C. auris) on hiivalaji, joka on viime vuosina levinnyt voimakkaasti eri puolilla maailmaa, aiheuttaen hankalia sairaalaepidemioita myös useissa Euroopan maissa. Sairaala- ja ympäristön kannalta C. auriksen tekee hankalaksi sen kyky kolonisoida tehokkaasti sekä sairaalaympäristöä ja potilaita ja sen taipumus kehittää resistenssiä yhtä tai useampia, pahimmassa tapauksessa kaikkia käytettävissä olevia systeemisiä sienilääkkeitä kohtaan. Osassa epidemioista on lisäksi kuvattu C. auris –kolonisaatioon liittyen muita hiivoja herkemmin verisuonikanyyleihin liittyviä sepsiksiä ja muita invasiivisiä taudinkuvia. Erityisen suuren riskin C. auriksen leviämislle muodostavat suorat sairaalasiirrot niistä maista, joissa on kyseisellä hiivalla kolonisoituneita hoitoyksiköitä. C. auriksen mahdollisimman nopea toteaminen ja asianmukaisten varo- ja siivoustoimien käyttäminen ovat keskeisessä asemassa ympäristön ja potilaiden kolonisoitumisen, sekä kolonisoitumisesta herkästi seuraavan laajemman epidemian välttämiseksi.
Kuka on Candida auris -kantaja?	Kantaja on henkilö, jolla on joskus ollut C. auris -infektio tai oireeton löydös (ja jota ei sittemmin ole todettu asianmukaisissa seurantaseulonnoissa negatiiviseksi).
Kuka on Candida auris -altistunut?	C. auris –altistunut on henkilö, jota on hoidettu samassa potilashuoneessa C. auris –kantajan kanssa tai joka on ollut epidemia-aikaan samalla osastolla aiemmin tunnistamattoman C. auris -kantajan kanssa. Hygieniahoitaja ja infektio lääkäri auttavat altistuneiden määrittelyssä. Kantajuus suljetaan pois seulontanäytteillä (CaauVi 21786) .
Milloin potilaalla katsotaan oleva muu riski C. auris-kantajuudelle?	Potilas, joka tulee suorana sairaalasiirtona ulkomailta tai jonka läheteessä on tieto riskistä. Kantajuus suljetaan pois seulontanäytteillä (CaauVi 21786) .