

VRE (Vankomysiinille resistentti enterokokki)

| | VRE-kantaja | VRE-altistunut | Muu riski VRE-kantajuu- delle |
|----------------------------|--|---|--|
| Määritelmä | <ul style="list-style-type: none"> Hälytysjärjestelmässä on tieto VRE-kantajuudesta Kliinisestä näytteestä löytyy VRE | <ul style="list-style-type: none"> Hälytysjärjestelmässä on tieto VRE-altistuksesta Epidemiaepäilyissä / epidemiatilanteessa näytteenotto ja kosketusvarotoimet ohjeistetaan erikseen | <ul style="list-style-type: none"> Suora sairaalasiirto ulkomaisesta sairaalasta Lähetteessä tieto riskistä |
| Varotoimet | Kosketusvarotoimet | Tavanomaiset varotoimet | Kosketusvarotoimet kunnes kantajuus on poissuljettu seulontanäytteillä |
| Potilaan sijoittelu | 1-hengen huone <ul style="list-style-type: none"> jos 1 hh ei käytettävissä niin yhteys hygieniahoitajaan Tilavarotoimet <ul style="list-style-type: none"> Ei sovellu, jos eritteet kontaminoivat ympäristöä esim. erittävät haavat tai ulosteinkontinenssi Ajantavarausplk tavanomaiset varotoimet | | 1-hengen huone <ul style="list-style-type: none"> Jos 1 hh ei käytettävissä niin yhteys hygieniahoitajaan Tilavarotoimet <ul style="list-style-type: none"> Ei sovellu, jos eritteet kontaminoivat ympäristöä esim. erittävät haavat tai ulosteinkontinenssi |
| VRE- näytteet (VREVI 1788) | <ul style="list-style-type: none"> Yhdet seulontanäytteet jos edellisistä positiivista seulontanäytteestä on yli vuosi | <ul style="list-style-type: none"> Kahdet seulontanäytteet peräkkäisinä päivinä Poliklinikkapotilaasta voidaan ottaa kahdet seulontanäytteet samalla käynnillä | <ul style="list-style-type: none"> Kahdet seulontanäytteet peräkkäisinä päivinä Poliklinikkapotilaasta voidaan ottaa kahdet seulontanäytteet samalla käynnillä |
| Näytteenotokohdat | <ul style="list-style-type: none"> Rektum Erittävät haavat Trakea, jos keinoilmatie Katetrivirtsaa, jos katetri on ollut yli viikon | | |
| Hälytystiedon purku | Jos näytteet negatiiviset, ota yhteys hygieniahoitajaan, joka voi purkaa altistumisen tai kantajuuden erillisen ohjeen mukaan. | | |
| Siivous | Katso erilliset ohjeet Potilashuoneen siivous ja pyykin käsittely | | |

VRE – lisätietoa

| | |
|---------------------------------|--|
| Potilasohjeet | <p>Kysymyksiä ja vastauksia VRE:stä</p> <p>Tietoa altistumisesta VRE-bakteerille</p> |
| Mikä on VRE ? | <p>VRE = vankomysiinille resistentti enterokokki.</p> <p>Tavallisesti VRE löytyy ulosteesta, mutta usein myös potilaan käsistä ja iholta.</p> <p>VRE leviää tavallisimmin kosketustartuntana henkilökunnan käsien välityksellä potilaasta toiseen.</p> <p>VRE säilyy tarttumiskykyisenä pitkään hoituhuoneen kosketuspinnolla, jos sitä joutuu niihin esimerkiksi eritteiden tai käsien välityksellä.</p> <p>Oireettoman kolonisaation lisäksi VRE voi aiheuttaa infektioita, joista tyypillisiä ovat virtsatieinfektiot, leikkausalueen infektiot ja bakteremiat.</p> |
| Kuka on <u>VRE-kantaja</u> ? | <p>Kantajaksi sanotaan henkilöä, jolla on joskus todettu VRE-infektio tai oireeton löydös.</p> |
| Kuka on <u>VRE-altistunut</u> ? | <p>Hygieniahoitaja määrittelee henkilön VRE-altistuneeksi, jos häntä on hoidettu samassa potilashuoneessa tai epidemia-aikaan samalla osastolla aiemmin tunnistamattoman VRE-kantajan kanssa.</p> <p>Altistuneella voi olla VRE, ja se tulee sulkea pois VRE-seulontanäyttein.</p> |