

## Opiskelijoiden harjoittelu HUSissa koronavirusepidemian aikana: toiminta opiskelijan sairastumis- ja altistumistilanteissa

HUS on opetussairaala, jonka tiloissa liikkuu runsaasti lääketieteen ja terveystieteiden opiskelijoita. **HUSissa opintojaan suorittaviin opiskelijoihin sovelletaan pääosin samoja koronavirustartuntatauti-epidemian ehkäisyyn liittyviä päätöksiä kuin HUSin henkilöstöön.**

HUSissa **kirurgista suunenäsuojainta tai FFP-hengityksensuojainta** käytetään kaikissa potilaskontakteissa/-tiloissa sekä tiloissa, joissa liikkuu potilaita (esim. aulat, osastojen käytävät). Niitä käytetään myös henkilökunnan kansliatiloissa tai työ- ja kokoushuoneissa, jos tilassa on paljon ihmisiä tai työskennellään lähekkäin.

### 1. Opiskelijalla on COVID-19-infektioon viittaavia oireita

- Opiskelija jää pois harjoittelusta välittömästi ja välttää kodin ulkopuolisia kontakteja.
- Oireinen opiskelija hakeutuu laboratoriossa tehtävään PCR-testiin ([www.koronabotti.hus.fi](http://www.koronabotti.hus.fi)), vaikka mahdollinen kotona tehtävä antigeenitesti olisi negatiivinen. Jos kodin ulkopuolella on liikuttava, suositellaan käyttämään kirurgista suunenäsuojainta tai venttiilitöntä FFP2-hengityksensuojainta.
- Opiskelija ilmoittaa sairastumisesta harjoittelun työyksikön esihenkilölle.
- Esihenkilö kartoittaa sairaalan sisällä mahdolliset altistuneet potilaat ja työntekijät.
- Koronaa tai muuta hengitystieinfektiota sairastava opiskelija voi palata harjoitteluun, kun oireet ovat selkeästi vähentyneet ja kuume on kokonaan poissa.
- Töihin palatessa opiskelija käyttää venttiilitöntä FFP2-hengityksensuojainta, kunnes oireiden alusta on kulunut 5 vrk. Oireiden alkamispäivä lasketaan päiväksi nolla. Ruokailu tulee toteuttaa siten, että työntekijän ollessa ilman FFP2-hengityksensuojainta, hän on muista henkilöistä yli 2 m päässä ja alle 15 minuutin ajan, tai työntekijä viettää ruokailutilanteet yksin.
- Kun oireiden alusta on kulunut > 5 vrk, opiskelija noudattaa HUSin suojainohjeita kirurgisen suunenäsuojaimen ja FFP-hengityksensuojaimen käytöstä.

### 2. Opiskelija on altistunut koronavirusepidemialle ja on oireeton

- Jos opiskelija on sairastanut itse laboratoriovarmistetun koronavirusepidemian 1 kk sisällä, häntä ei katsota altistuneeksi.

- Altistunut työskentelee normaalisti, jos hän on oireeton (ks. suojain- ja ruokailuohjeet alla). Jos hänelle tulee oireita, hän jää pois harjoittelusta ja hakeutuu laboratoriossa tehtävään PCR-testiin ([www.koronabotti.hus.fi](http://www.koronabotti.hus.fi)), vaikka mahdollinen kotona tehtävä antigeenitesti olisi negatiivinen.
- Kaikki altistuneet opiskelijat koronavirusrokotuksista huolimatta käyttävät työaikana kirurgista suunenäsuojainta tai venttiilitöntä FFP2-hengityksensuojainta 10 vrk ajan altistustilanteen jälkeen. Ruokailu tulee toteuttaa 2 m turvavälein ja alle 15 min tai viettää ruokailutilanteet yksin.
- Pääsääntöisesti hyvinvointialueet eivät enää aseta altistuneita karanteeniin. Jos kuitenkin hyvinvointialueen tai HUS-yhtymän tartuntataudeista vastaava lääkäri tekee päätöksen mahdollisesta karanteenista, sitä tulee aina noudattaa.

*Hoito-ohje | Laatijat: Susanna Ruuskanen ja Eeva Ruotsalainen | Hyväksyjä: Tulehduskeskus Eeva Ruotsalainen | 26.1.2022, päivitetty 10.1.2023*