

Magnetundersökning av tunntarmen hos barn

Ditt barn har fått en remiss för en magnetundersökning.

Bekanta dig med blanketten för förhandsuppgifter redan i förväg. Ta den ifyllda blanketten med dig.

Kom till magnetundersökningen 1 timme före egentliga undersökningstiden för förberedelser.

Reservera 3 timmar för besöket. Undersökningen tar cirka 30 minuter. En patient som behöver en brådskande undersökning kan tas in före ditt barn.

Om du har några frågor angående undersökningen finns kontaktuppgifter i ankomsanvisningen eller i kallelsebrevet.

Före undersökning

Eventuell järntablettmedicinering bör avslutas 5 dagar före undersökningen.

Dagen före undersökningen

- Får äta fett- och fiberfattig mat: ljust bröd, saftsoppa, potatis, mager fisk och broiler.
- Får inte äta kött, grönsaker, frukt, gröt, fullkornsbröd, smör eller dricka mjölk.
- Kl. 16 bör ta två Toilax-tabletter med vatten för att tömma tarmen.

Efter det får ännu äta enligt ovannämnda diet.

Laxermedlen får du antingen från den remitterande enheten eller köper dem på apotek.

På undersökningdagen

- Bör vara oäten.
- På morgonen får dricka 1–2 glas vatten
- Ta de läkemedel som läkaren ordinerat.
- Fäst inte eventuellt medicinplåster på barns huden.

Smycken och pincerings skall avlägsnas före undersökningen och helst lämnas hemma.

Under undersökning

Börja dricka vätskan, som fyller tunntarmen 50 minuter före undersökningen och en kanyl förs in i handvenen.

Vid magnetundersökningen får man exakta anatomiska bilder utan röntgenstrålning. Bild-tagningen sker i en tunnliknande apparat som är öppen i båda ändorna. Det är även möjligt att ha en följeslagare med i undersökningsrummet.

Under undersökningens gång kan du ge tecken eller prata med skötaren som utför undersökningen.

För att undersökningen skall lyckas bör barnet vara absolut stilla. Under undersökningens gång ligger barnet på mage. Skötaren försöker göra ställningen så bekväm som möjligt.

Under undersökningen hörs ett rätt starkt ljud och därför får barnet öronproppar och hörselskydd.

Via hörselskyddet får barnet under undersökningens gång anvisningar för hur han/hon ska andas.

Barnet ska hålla andan cirka 10–20 sekunder åt gången.

Före undersökningen är det bra att öva att hålla andan.

I början av undersökningen injiceras läkemedel i venen, vilket gör att tarmen slappnar av. Under undersökningens gång injiceras kontrastmedel i venen, som inte innehåller jod. Kontrastmedlet utsöndras genom urinen.

Efter undersökning

Undersökningen kräver ingen eftervård.

Kontrastmedlet som barnet dricker på röntgen kan förorsaka tillfällig diarre.

Undersökningens resultat får du av den vårdande läkaren. Om du inte har fått en mottagningstid eller telefontid, kontakta den vårdande enheten.

Annat att beakta

Ta med dig FPA-kort eller identitetsbevis.

Inga separata avgifter tillkommer för undersökningen.

Avboka tiden om du inte kan komma.

Om du inte avbokar tiden kommer du att debiteras en straffavgift.

För mera information

Läs mer på internet

www.undersokningshuset.fi >> Olika undersökningar >> Magnet

Titta på videor om undersökningar:

www.youtube.com >> Tutkimukset minuutissa: Magneettitutkimus