

Varotoimet ja MRSA-näytteet pistoshuumeiden käyttäjien kohdalla

HUSin alueen suonensisäisiä huumeita käyttävillä on kohonnut MRSA-kantajuuden riski.

- Päivystykseen hakeutuvilta suonensisäisiä huumeita käyttäviltä otetaan infektiopesäkkeiden bakteeriviljelyiden ja mahdollisten veriviljelyiden lisäksi MRSA-seulontanäytteet (tutkimustilaus 4358) alla luetelluista kohdista. Mikäli hän jää sairaalahoitoon, näytteet otetaan kahdesti, kahtena eri päivänä:
 - nenä ja nielu sekä rectum/perineum
 - mahdolliset ihorikot ja haavat
 - katetrivirtsat, jos katetri ollut yli viikon
 - muiden katetrien ja dreerien tyvet
- Potilaan hoidossa noudatetaan kosketusvarotoimia, kunnes kahdet seulontanäytteet on vastattu negatiivisiksi.
- Jos potilas jää sairaalahoitoon, hänet sijoitetaan mahdollisuuksien mukaan yhden hengen huoneeseen. Jos tällaista ei ole saatavilla, potilas sijoitetaan [tilavarotoimien](#) mukaisesti.
- Jos suonensisäisiä huumeita käyttävällä epäillään vaikeaa yleisinfektiota, konsultoidaan infektiolääkärinä mahdollisen MRSA:han kohdistuvan hoidon aloittamisesta.
- Myös HIV-testi (HIV-AgAb 4814) otetaan, ellei testiä ole tehty 3 kk sisällä ja jos potilas on siihen suostuvainen.
- **Potilasohje:** Hygieniaohje pistoshuumeiden käyttäjille MRSA-infektioiden ehkäisemiseksi