


Pisaravarotoimet

Pisaravarotoimien tarkoituksena on estää pisaroiden leviäminen. Tavanomaisten varotoimien lisäksi olennaista on kirurgisen suu-nenäsuojaimen ja silmäsuojaimen/visiirin käyttö läihoidossa ja potilaan hoitaminen yhden hengen huoneessa tai tilavarotoimin. **Ne kohdat, joissa on yksi tai useampi eroavuus tavanomaisiin varotoimiin, on merkitty vihreällä.**

Potilashuone

Huoneen valinta	<ul style="list-style-type: none"> 1 h huone, jossa oma wc ja suihku suositeltavia Usein tilavarotoimet/kohortti on riittävä
Huoneen varustelu	<ul style="list-style-type: none"> Laita oveen tai sulkuun pisaravarotoimikyyltti Potilaskohtaiset hoito-, tutkimus- ja siivousvälineet, pyykki- ja jätteastiat Varaa vain 1 vrk tarpeisiin välineitä ja tarvikkeita Älä säilytä lavuaarin ympärillä olevalla tasolla mitään tavaroita

Käsihygieniä ja suojakäsineet

Desinfioi kädet Katso: Desinfektiotekniikka	<ol style="list-style-type: none"> Ennen kuin kosketat potilasta tai lähiympäristöä Juuri ennen aseptista toimenpiteitä Heti eritteiden käsittelyn jälkeen riisuttuasi suojakäsineet Potilaan/ potilaan lähiympäristön koskettamisen jälkeen <ul style="list-style-type: none"> Ennen elintarvikkeiden käsittelyä Wc käynnin jälkeen Käsien saippuapesun jälkeen 	 <p>Nejō muistutteenä HYVÄÄN KÄSIHYGIENIAAN</p>
Käytä suojakäsineitä	<ul style="list-style-type: none"> Kun käsittelet eritteitä, haavoja, ihorikkoja, limakalvoja tai eritteillä kontaminoituneita alueita tai välineitä Ota suojakäsineet paketista ja pue ne desinfioiduin käsin Vaihda suojakäsineet tarvittaessa aseptisen työjärjestyksen mukaan Desinfioi kädet suojakäsineiden riisumisen jälkeen Pue suojakäsineet potilashuoneessa juuri ennen tarvetta ja riisu ne heti tarpeen loppuessa 	
Pese kädet vedellä ja saippualla	<ul style="list-style-type: none"> Kun kädet ovat näkyvästi likaiset tai tuntuvat likaisilta WC-käynnin jälkeen Kun olet hoitanut gastroenteriittipotilasta 	

Huomioi kellot, korut, kynnet ja iho	<ul style="list-style-type: none"> • Rannekello, älykello, sormukset, käsikorut, rakenne- ja geelikynnet sekä kynsilakka ovat kielletty • Kynsien tulee olla lyhyet ja käsien ihon ehjä
Ohjaa potilasta ja vierailijoita	<ul style="list-style-type: none"> • Käyttämään käsihuuhdetta • Käy läpi: <ul style="list-style-type: none"> ○ Hygieniaohe sairaalassa oleville potilaille (aikuinen) ○ Hygieniaoheita sairaalassa oleville potilaille ja heidän läheisilleen

Suojaimet

Suojaimet, paitsi FFP-hengityksensuojain, puetaan ensisijaisesti potilashuoneessa tai sulkuutilassa ja riisutaan potilashuoneessa.

Kirurginen suu-nenäsuojain II tai IIR	<ul style="list-style-type: none"> • Käytä alle 2 m etäisyydellä potilaasta
FFP2- tai FFP3-hengityksensuojain	<ul style="list-style-type: none"> • Aerosoleja tuottavien toimenpiteiden yhteydessä influenssa sairastavan hoidossa, katso: Influenssaohjeet • COVID-19-potilaan hoidossa, katso: COVID-19 suojainohjeet • Pue ja riisu potilashuoneen ulkopuolella
Suojalasit tai visiiri	<ul style="list-style-type: none"> • Käytä lähihoidossa
Suojatakki tai hihallinen suojaesiliina	<ul style="list-style-type: none"> • Jos on riski eritteiden roiskumisesta työvaatteille

Eritealvistumisen vähentäminen

Eritetahrat	<ul style="list-style-type: none"> • Poista näkyvät eritetahrat välittömästi • Huom! Tarkista tarvittava desinfektioainepitoisuus, katso: Eritetahradesinfektio
Pistävät ja viiltävät esineet	<ul style="list-style-type: none"> • Laita pistävät ja viiltävät esineet suoraan keräysastiaan • Älä laita käytettyjä neuloja takaisin neulansuojukseen • Katso: Veritapaturmaohjeet

Hoito- ja tutkimusvälineiden huolto, potilashuoneen siivous

Hoito- ja tutkimusvälineet	<ul style="list-style-type: none"> • Huone- ja potilaskohtaiset tai kertakäyttöiset välineet • Monikäyttöisten puhdistus, desinfektio tai sterilointi käyttötavan mukaan, katso: Hoito- ja tutkimusvälineiden puhdistusohje • Älä laske hoito-/tutkimusvälineitä potilaan sängylle
-----------------------------------	---

Siivous	<ul style="list-style-type: none"> • Huonekohtaiset siivousvälineet • Katso: potilashuoneen siivous • Sama suojavaatetus kuin potilasta hoitavalla henkilökunnalla • Ennen loppusiivousta huone tyhjennetään hoitotarvikkeista
Likapyykki, eritteet ja jätteet	<ul style="list-style-type: none"> • Pakkaa pyykki ja jätteet ohjeiden mukaisesti, katso: Pyykin käsittely • Kaada eritteet suoraan huuhtelu- ja desinfektiokoneeseen, ei potilashuoneen käsienvesualtaaseen tai wc-pönttöön

Potilaan kuljettaminen ja kuntoutus

Potilaan kuljettaja	<ul style="list-style-type: none"> • Desinfioi kädet ennen kuljetusta ja sen jälkeen • Käytä kirurgista suu-nenäsuojainta • Suojakäsineitä ei käytetä • Siirrä potilas suoraan tutkimukseen/toimenpiteeseen ja takaisin • Katso: Potilaan kuljetus sairaalassa
Potilas kuljetettaessa	<ul style="list-style-type: none"> • Jos mahdollista kirurginen suu-nenäsuojain • Jos potilas ei pysty käyttämään kirurgista suu-nenäsuojainta, annetaan potilaalle kertakäyttö nenäliinoja ja roskapussi
Potilaan kuntouttaja	<ul style="list-style-type: none"> • Voit kuntouttaa potilasta osaston yleisissä tiloissa, kun potilaalla on kirurginen suu-nenäsuojain, desinfioidut kädet ja mahdolliset haavat on peitetty.

Potilaan ja vierailijan ohjaus

Varotoimet	<ul style="list-style-type: none"> • Kerro potilaalle varotoimien tarkoitus • Ohjaa vierailijoita varotoimikäytänteissä
Yskimishygienia	<ul style="list-style-type: none"> • Opeta potilaalle oikeaoppinen yskimishygienia

Pisaravarotoimien käyttö

Pisaravarotoimien tarkoituksena on katkaista suurten pisaroiden (kooltaan yli 5µm) välityksellä tapahtuva tartunta. Pisaroita syntyy yskiessä, niistäessä, puhuessa, aivastaessa ja hengitysteiden toimenpiteissä. Pysähtyvät pisarat putoavat melko pian alas eivätkä yleensä kulkeudu yli metriä kauemmas. Alla **esimerkkejä** pisaravarotoimin hoidettavista taudeista. Muut, katso: aakkosellinen luettelo.

1. Bakterimeningiittipotilas	<ul style="list-style-type: none"> • Hoidetaan aluksi pisaravarotoimien mukaan • Kun taudinaiheuttaja on selvillä, potilas, jolla on meningokokin (A, B, C, W, Y) tai <u>Haemophilus influenzae b:n (Hib)</u> aiheuttama meningiitti • Hoidetaan 24 h tehoavan mikrobi lääkkeen aloituksesta
2. Hematologian- ja muilla syvästi immuunipuutteisia hoitavilla osastoilla hengitystieinfektiopotilas	<ul style="list-style-type: none"> • Pisaravarotoimet koko hoitojakson ajan
3. Jos mikrobiologinen diagnoosi on tiedossa, hoidetaan pisaravarotoimin	<ul style="list-style-type: none"> • COVID-19: ks erilliset ohjeet • Haemophilus influenzae: 24 h tehokkaan mikrobilääkehoidon aloituksesta • Hinkuyskä (pertussis): 5 vrk tehoavan mikrobilääkehoidon aloituksesta • Influenssa: 5 päivää oireiden alusta tai 3 vrk lääkehoidon alusta. Immuunipuutteisten osastoilla koko hoitojakson ajan. • Lapsia hoitavilla osastoilla: <ul style="list-style-type: none"> ○ Parainfluenssa koko hoitojakson ajan ○ Adenovirus pisaravarotoimet koko hoitojakson ajan. Lisäksi kosketusvarotoimet. • Meningokokki (eristetty normaalisti steriilistä paikasta): 24 h tehokkaan mikrobilääkehoidon aloituksesta • Parvorokko B19: hematologian ja muilla syvästi immuunipuutteisia hoitavilla osastoilla koko hoitojakson ajan. • RSV: <ul style="list-style-type: none"> ○ Lastenosastoilla sekä immuunipuutteisten osastoilla: pisara- ja kosketusvarotoimet 10 vrk ajan oireiden alusta. ○ Muuten: Pisaravarotoimet 5 vrk ajan oireiden alusta. Yhden hengen huone/tilavarotoimet (ei samaan huoneeseen immuunipuuteisen kanssa). • Tulirokko (scarlatina) tai A-streptokokkitonsilliitti/faryngiitti lapsella: 24 tuntia tehoavan lääkehoidon alusta
4. Apinarokko	<ul style="list-style-type: none"> • Kosketus-, pisara- ja ilmavarotoimet, katso: Apinarokko
5. COVID-19	<ul style="list-style-type: none"> • Katso COVID-19-ohjeet, Suojainohjeet