

Potilaan kuljetus sairaalassa

Potilaskuljettaja noudattaa aina tavanomaisia varotoimia eli desinfioi kätet ennen ja jälkeen potilaskuljetuksen. **Potilaskuljettaja ei käytä suojakäsineitä kuljetuksen aikana.** Muiden suojaimien käytöstä kuljetuksen aikana ohjataan tässä ohjeessa pisara- ja ilmavarotoimien kohdalla.

Ennen kuljetusta **hoitaja** huolehtii, että potilassängyn päädyt tai pyörätuolin kahvat ovat puhtaat ja sängyn päätyyn lisätään käsihuhde telineessä, jos se puuttuu. Tarvittaessa sängyn päädyt tai pyörätuolin kahvat voidaan pyyhkiä soveltuvalla pintadesinfektioliinalla. Katso - Pintadesinfektioaineet. **Hoitaja** huolehtii, että kuljetettavan potilaan potilasvaatteet ja mahdolliset vuodevaatteet ovat puhtaat ja tarvittaessa vaihtaa ne, lisäksi hän huolehtii, että haavat ja ihon rikkoumat ovat peitossa ja sidokset ovat puhtaat. Myös **potilas** desinfioi kätet ennen kuljetusta, tarvittaessa hoitaja avustaa potilasta käsien desinfektiossa.

Kosketusvarotoimet

- Kuten tavanomaisissa varotoimissa.
- Potilas siirretään suoraan tutkimukseen tai toimenpiteeseen ja takaisin

Pisaravarotoimet

- Kuten tavanomaisissa varotoimissa, lisäksi kuljettaja käyttää kirurgista suu-nenäsuojainta.
- Kuljetuksen aikana potilaalle kirurginen suu-nenäsuojain, mikäli potilas pystyy sitä käyttämään.
- Mikäli potilas ei pysty käyttämään kirurgista suu-nenäsuojain, hoitaja ohjaa hänelle oikean yskimistekniikan ja antaa riittävästi nenäliinoja ja roskapussin mukaan kuljetuksen ajaksi.
- Potilas siirretään suoraan tutkimukseen tai toimenpiteeseen ja takaisin lähtöosastolle.

Ilmavarotoimet

- Kuten tavanomaisissa varotoimissa, lisäksi kuljettaja käyttää FFP3-luokan hengityksensuojainta. Jos se ei istu kasvoille tiiviisti, voidaan käyttää erimallista FFP2-luokan venttiilitöntä hengityksensuojainta.
- Kuljetuksen aikana potilaalle FFP2-luokan venttiilitön hengityksensuojain (mikäli potilas ei pysty FFP-hengityksensuojainta käyttämään, annetaan hänelle kirurginen suu-nenäsuojain)
- Potilas siirretään suoraan tutkimukseen tai toimenpiteeseen ja takaisin lähtöosastolle.