

Moniresistenttien mikrobien riskinarvio, varotoimet ja näytteet potilaan tullessa ulkomailta

Määritelmä	Vuoden sisällä sairaalahoito ulkomailla (suorat sairaalasiirrot ks. viereinen sarake) <ul style="list-style-type: none"> > 24 h-kestoinen sairaalahoito tai toimenpide 	Suorat sairaalasiirrot	Vuoden sisällä <ul style="list-style-type: none"> Suomeen tullut turvapaikanhakija, paperiton ja pakolainen ulkomaisessa lastenkodissa asunut
Varotoimet	Kosketusvarotoimet kunnes kahdet seulontanäytteet ovat osoittautuneet negatiivisiksi. <ul style="list-style-type: none"> 1-hengen huone Jos 1 hh ei käytettävissä, tilavarotoimet ja virka-aikana yhteys hygieniahoitajaan potilaan sijoittelusta. Tilavarotoimet ei sovellu, jos eritteet kontaminoivat ympäristöä (esim. erittävät haavat tai hilseilevä ihosairaus) 	Kosketusvarotoimien lisäksi kädet pestään vedellä ja saippualla aina potilashuoneesta poistuttaessa; pesun jälkeen kädet desinfioidaan alkoholihuuhteella. Voimassa kunnes kahdet seulontanäytteet ovat osoittautuneet negatiivisiksi <ul style="list-style-type: none"> 1-hengen huone Jos 1 hh ei käytettävissä, tilavarotoimet ja virka-aikana yhteys hygieniahoitajaan potilaan sijoittelusta. Tilavarotoimet ei sovellu, jos eritteet kontaminoivat ympäristöä (esim. erittävät haavat tai hilseilevä ihosairaus) 	Kosketusvarotoimet kunnes kahdet seulontanäytteet ovat osoittautuneet negatiivisiksi <ul style="list-style-type: none"> 1-hengen huone Jos 1 hh ei käytettävissä, tilavarotoimet ja virka-aikana yhteys hygieniahoitajaan potilaan sijoittelusta. Tilavarotoimet ei sovellu, jos eritteet kontaminoivat ympäristöä (esim. erittävät haavat tai hilseilevä ihosairaus) Raskaana oleva turvapaikanhakija: <ul style="list-style-type: none"> Jos ensimmäiset seulontanäytteet negatiiviset, hoito tavanomaisin varotoimin Seulomaton: Kosketusvarotoimet
Näytteenotto	<ul style="list-style-type: none"> Seulontanäytteet kahtena eri päivänä Poliklinikkapotilaasta voidaan ottaa kahdet seulontanäytteet samalla käynnillä (otetaan vain, jos potilas on tulossa osastolle tai toimenpiteeseen) 	<ul style="list-style-type: none"> Seulontanäytteet kahtena eri päivänä 	<ul style="list-style-type: none"> Seulontanäytteet kahtena eri päivänä Poliklinikkapotilaasta voidaan ottaa kahdet seulontanäytteet samalla käynnillä (otetaan vain, jos potilas on tulossa osastolle tai toimenpiteeseen) Raskaana oleva turvapaikanhakija: <ul style="list-style-type: none"> 1. seulontanäytteet noin kuukautta ennen laskettua aikaa 2. seulontanäytteet synnyttämään tullessa. Jos 1. seulonnassa on saatu positiivinen vastaus, ei uusia näytteitä tarvita.

Näytteenottokohdat	<p>MRSA (MRSAVi 4358)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Nenä, nielu, rektum/perineum • Erittävät haavat ja merkittävät ihorikot, vastasyntyneillä napa • Katetrivirtsat, jos katetri on ollut yli viikon • Trakea, jos keinoilmatie <p>MDRs (MDRsVi 6730)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Rektum • Erittävät haavat ja merkittävät iholeesiot • Katetrivirtsat, jos katetri ollut > 7 vrk • Trakea, jos keinoilmatie 	<p>MRSA (MRSAVi 4358)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Nenä, nielu, rektum/perineum • Erittävät haavat ja merkittävät ihorikot, vastasyntyneillä napa • Katetrivirtsat, jos katetri on ollut yli viikon • Trakea, jos keinoilmatie <p>Lisäksi sydänleikkaukseen tulevilta lapsilta MRSA-pcr (MRSANhO 4981)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Nenä, nielu, rektum/perineum • Erittävät haavat ja merkittävät ihorikot, vastasyntyneillä napa <p>MDRs (MDRsVi 6730)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Rektum • Erittävät haavat ja merkittävät iholeesiot • Katetrivirtsat, jos katetri ollut > 7 vrk • Trakea, jos keinoilmatie <p>VRE (VREVi 1788)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Rektum <p>Candida auris (CaauVi 21786)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kainalot (yhdellä tikulla näyte kummastakin kainalosta) • Nivuset (yhdellä tikulla kummastakin nivusesta) • Nielunäyte; jos keinoilmatie, nielun sijasta näyte trakealimasta • Rektum • Haavat (näyte erittävimmästä haavasta), • Katetrivirtsat, jos virtsakatetri ollut >7vrk 	<p>MRSA (MRSAVi 4358)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Nenä, nielu, rektum/perineum • Erittävät haavat ja merkittävät ihorikot, vastasyntyneillä napa • Katetrivirtsat, jos katetri on ollut yli viikon • Trakea, jos keinoilmatie <p>Lisäksi lapsilta ESBL (MDRsVi 6730)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Rektum
---------------------------	---	--	--