

Magnetundersökning av prostata

Eturauhasen magneettikuvauus

Vid magnetundersökningen får man exakta anatomiska bilder utan röntgenstrålning. Bildtagningen sker i en tunnelliknande apparat som är öppen i båda ändorna.

Undersökningen görs med en apparat som är som en tunnel som är öppen i båda ändarna.

**Bekanta dig med blanketten för förhandsuppgifter redan i förväg.
Ta den ifyllda blanketten med dig.**

Reservera cirka 3 timmar för undersökningen.

Undersökningen tar 30–60 minuter.

En patient som behöver en brådskande undersökning kan tas in före dig.

Om du har några frågor angående undersökningen finns kontaktuppgifter i ankomsanvisningen eller i kallelsebrevet.

Har du cellskräck det vill säga klaustrofobi, berätta om det i samband med anmälningen.

Du kan få lugnande medel före undersökningen.

Om du tar lugnande medel, kan du inte köra bil.

Du kan ta med en stödperson.

Stödpersonen får vara med i undersökningsrummet under avbildningen om han eller hon inte har något hinder för det.

Se anamnesblanketten inför en magnetundersökning.

Om du har en ledprotes i höften ska du ringa till enheten där man har reserverat en undersökningstid för dig.

Ledprotesen i höften kan ha en betydelse för valet av apparat vid din undersökning.

Kontaktuppgifterna finns i ankomstanvisningen.

Före undersökning

För tarmtömning ska du köpa på apoteket en Toilax-kombinationsförpackning, som innehåller 4 enterotabletter och 1 rektalsuspension.

Du får dem receptfritt.

Det är viktigt att du tömmer tarmen enligt anvisningen.

Dagen före undersökningen:

- Ät och drick som vanligt.
- Ta läkemedlen som läkaren ordinerat på normalt sätt.
- Ta på morgonen två 2 Toilax-tabletter.
Se anvisningen i förpackningen.
- Ta 2 Toilax-tabletter på kvällen.

På undersökningdagen:

- Ta bort smycken och lämna dem hemma.
- Lägg lavemanget hemma 3–4 timmar innan undersökningen.
Se anvisningen i förpackningen.
Lavemanget tömmer ändtarmen.
- Ät ingenting 4 timmar före undersökningen.
- Du kan dricka vatten.
- Ta läkemedlen som du använder regelbundet.
- **Om du har ett läkemedelsplåster** ska du programmera bytet till undersökningdagen.
Ta bort det gamla plåstret under undersökningen.
Lägg ett nytt plåster efter undersökningen.
- **Om du har en sensor som mäter sockerhalten** i vävnadsvätskan, måste den avlägsnas innan undersökningen.
Ta med en ny sensor.

Under undersökning

Innan undersökningen inleds måste du gå på toaletten.

Innan undersökningen ska du byta till sjukhuskläder.

Röntgenskötaren hjälper dig att hitta en bekväm ställning i liggande på undersökningsapparatens brits.

För att undersökningen ska lyckas måste du vara orörlig.

Du får öronproppar och hörselskydd eftersom undersökningsapparaten låter högt.

Du kan lyssna på radion om du vill.

Röntgenskötaren är i ett angränsande rum under undersökningen.

Skötaren ser och hör dig under undersökningen.

Du får en kanyl i blodkärlet.

Via den får du ett läkemedel som fårtarmarna att slappna av.

På så sätt får man bättre bilder.

Röntgenläkaren beslutar om du behöver få magnetkontrastmedel i blodkärlet.

Kontrastmedlet gör att man kan urskilja vävnaderna i avbildningarna.

Efter undersökning

Du får undersökningsresultaten av läkaren som vårdar dig.

Om du inte vet hur du får resultaten, fråga polikliniken eller avdelningen som skickade dig till undersökningen.

Annat att beakta

Inga separata avgifter tillkommer för undersökningen.

Avboka tiden om du inte kan komma.

Om du inte avbokar tiden kommer du att debiteras en straffavgift.

För mera information

Läs mer på internet www.undersökningshuset.fi >> Olika undersökningar >> [Magnet](#).

Titta på videor om undersökningar: www.youtube.com >> Tutkimukset minuutissa: [Magneettikuvaus](#).

Undertexter: svenska, finska, engelska.