

Рентгенологическое исследование мочевого пузыря с контрастом у ребенка в Новой детской больнице

Lapsen virtsarakon varjoainekuvauus Uudessa lastensairaalassa

Рентгенологическое исследование мочевого пузыря с контрастным веществом проводится для оценки, например, функций и строения мочевого пузыря, мочеиспускательного канала и мочеточников.

Во время исследования выполняются рентгеновские снимки области таза.

Исследование также называется «микционная цистоуретрография».

Выделите для прохождения процедуры 2 часа. Исследование обычно длится 30–60 минут. Ребенок, которому требуется срочное обследование, может попасть на процедуру раньше вашего ребенка.

Инструкция о прибытии содержит контактную информацию для связи со специалистами на случай, если у вас есть какие-либо вопросы по поводу исследования.

Перед обследованием

Чтобы предотвратить инфекцию мочевых путей, лечащий врач ребенка, выдавший направление на исследование, назначает ребенку прием антибиотиков до процедуры.

Лечащий врач также дает указания по приему этих лекарств.

Если вы не получили инструкции относительно лекарств, позвоните до дня исследования в то отделение, которое направило ребенка.

Если ребенок уже получает постоянный курс антибиотиков для профилактики инфекций мочевых путей (так называемое профилактическое лечение), давайте лекарство:

- **начиная с утра дня исследования**, два раза в день — утром и вечером;
- утром и вечером в течение 3 дней, то есть в день исследования и еще два дня после него.

Дозировка утром и вечером остается такой же, как и ранее назначенная.

Важно, чтобы ребенок получил антибиотик утром в день исследования.

Если ребенок не принял лекарство, проведение исследования невозможно.

Во время обследования

Во время исследования ребенок лежит на рентгеновском столе.

Врач вводит через мочеиспускательный канал в мочевой пузырь ребенка тонкую трубку — катетер. Для введения катетера используется обезболивающий гель.

Через катетер мочевой пузырь заполняется контрастным веществом. Врач делает рентгеновские снимки во время наполнения мочевого пузыря и мочеиспускания. После исследования катетер удаляется.

После обследования

О результатах исследования вам сообщит лечащий врач ребенка.

Если вы не знаете, как получить результаты, спросите об этом в поликлинике или в отделении, направившем ребенка на исследование.

Лечащий врач ребенка также предоставит инструкции о том, как продолжать антибиотикотерапию, если она назначена.

Обратите внимание

Возьмите с собой карту Kela ребенка или удостоверение личности.

На исследовании с ребенком может присутствовать один взрослый. Беременной женщине или женщине, которая предполагает беременность, нельзя находиться в рентгеновском кабинете.

За проведение исследования не взимается отдельной платы.

Отмените назначенное время, если не сможете прийти.