

Aseptiikka perifeerisen laskimokanyylin laitossa

Kanyylin ja pistopaikan valinta	- Valitse käyttötarkoitukseen soveltuva, mahdollisimman pieni turvakanyyli. - Harkitse pistopaikkaa. Suositeltava kohta on ei dominoivan yläraajan kämmenselkä tai kyynärvarsi. Vältä tulehtunutta tai rikkiäistä ihoa. Tervekohtien kanylointiin liittyy suurentunut infektioriski.
Valmistelu	Desinfioi kädet ja kerää tarvittavat välineet kertakäyttöisellä pesevällä pintadesinfektioliinalla puhdistetulle toimenpidepöydälle
Kanyylin laittaminen	- Desinfioi kädet - Etsi suoni ja laita staasi potilaalle - Puhdista iho ihon desinfektioaineella (Alkoholi 12t 80 %) yhdensuuntaisin vedoin, sidosten alle jäävältä alueelta ja anna sen kuivua. Pistokohtaan ei enää kosketa. - Desinfioi kädet ja laita tehdaspuhtaat suojakäsineet. Älä kosketa suojakäsineillä hoitoympäristöä tms. - Kanyloi suoni ja löysää staasi. - Laita käytetty neula suoraan neulankeräysastiaan. - Kiinnitä kanyyli huolellisesti steriilillä ”ikkunallisella” suojakalvolla, jotta juuri on nähtävissä. Älä koske kalvon sisäpintaan. - Katetrin päähän asetetaan neulaton liitin, johon voidaan tarvittaessa liittää infuusioletku. - Riisu suojakäsineet ja desinfioi kädet - Samalla kanyylillä ei saa pistää toista kertaa, vaan jokainen kanylointiyritys tehdään aina uudella puhtaalla kanyylillä.
Kirjaaminen	Kirjaa seurantalomakkeelle kanyylin koko, asettamisen ajankohta ja asetuspaikka.

Muutoshistoria

30.10.2025	Lisätty lause ” Älä kosketa suojakäsineillä hoitoympäristöä tms.” kohtaan kanyylin laittaminen.
3.11.2023	”Kanyylin ja pistopaikan valinta” laatikkoon lisätty lause ” Vältä tulehtunutta tai rikkiäistä ihoa.”
14.7.2021	Ohje julkaistu