

HUS:

Hengitystieinfektioiden ja noron epidemiatilanne viikoittain

Apulaisylilääkäri Eeva Ruotsalainen
HUS Tulehduskeskus, Epidemiologinen yksikkö


Korona
Influenssa
RSV
Adeno
Legionella
Mykoplasma
Noro

HUS: Influenssa, RSV ja korona osastohoidossa erikoissairaanhoidossa ja perusterveydenhuollossa, 2024–2025.




Korona-aktiivisuus on selvästi kasvanut, influenssatapaukset lisääntyneet parin laitosepidemian vuoksi.

Potilaat HUSin erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon sairaaloissa vko 41 asti



Potilaat HUSin erikoissairaanhoidon sairaaloissa vko 42 asti




Suomi ja HUS:


Korona vko 40–42/2025 asti
(viimeisin THL:n päivitys),
aktiviteetti on lisääntymässä

Suomi vko 41:


Jätevesipitoisuudet ovat olleet heinäkuusta alkaen nousussa (raportit muutamia viikkoja jäljessä).



HUS: Koronapositiivisten osuus otetuista
korona-PCR-näytteistä, vko 1/2025 – vko 42/2025.
Koronapositiivisten osuus on selvässä kasvussa, jo yli 10 %
ja kuvastaa ensisijaisesti sairaalahoitoon joutuneita.



HUS: Koronapotilaat osastohoidossa viikoittain 2024 – vko 40/2025 asti, erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon osastoilla yhtä paljon.




Kuvaaja: K. Parhiala, E. Ruotsalainen

Suomi ja HUS:


Influenssa vko 42/2025 asti –
epidemian odotetaan alkavan
loppuvuodesta

Suomi: Viikoittaiset influenssakäynnit terveyskeskuksissa vko 40/2024 – vko 42/2025.

Epidemia käynnistyi joulun aikaan 2024 nousten hitaasti,
huippuviikot 2-3/2025 vaihteessa.
Influenssakausi kesti puoli vuotta, loppui vasta kesäkuussa.



Lähde: THL, Avohilmo 2025-10-19




Lähde: THL, Avohilmo 2025-10-19

HUS: Influenssa vuosittain ja kuukausittain, 1995 – vko 42/2025.



Influenssaepidemia palautui koronapandemiaa edeltävälle paikalleen, myös voimakkuudeltaan.

Syksyn epidemia ei ole vielä alkanut, mutta influenssaa on jo liikkeellä ja rokotukset ovat käynnissä.




HUS: Influenssa viikoittain, vko 1/2025 – vko 42/2025.




Syksyn epidemia ei ole vielä alkanut, mutta influenssaa on jo liikkeellä
ja rokotukset ovat käynnissä.

ä r ä ä m e k e u l


Tartuntatautirekisterin tapausmäärät tulevat aina noin viikon jäljessä.



HUS: Influenssapositiivisten osuus otetuista
hengitystie-PCR-näytteistä, vko 1/2025 – vko 42/2025.
Influenssapositiivisten osuus on vasta 1,2 %.




HUS: Influenssan ikäryhmät viikoittain,
vko 1/2025 – vko 42/2025,
todetaan kaikenikäisillä.



HUS: Influenssapotilaat osastohoidossa viikoittain 2023 – vko 40/2025.

Influenssapotilaat osastohoidossa viikoittain, Uudenmaan hyvinvointialueet (Lähde: THL), 2025-10-20



HUS:

Respiratory Syncytial Virus (RSV)


vko 42/2025 asti,

epidemia voi alkaa marras-joulukuussa


HUS: RSV vuosittain ja kuukausittain, 1995 – vko 42/2025.




RSV-epidemia palautui koronapandemiaa edeltävälle paikalleen,
myös voimakkuudeltaan.
RSV-kausi kesti puoli vuotta, loppui vasta kesäkuussa.



HUS: RSV viikoittain, vko 1/2025 – vko 42/2025. Syksyn epidemia ei ole vielä alkanut.



HUS: RSV-positiivisten osuus otetuista hengitystie-PCR-näytteistä on matala, vko 1/2025 – vko 42/2025.




HUS: RSV, ikäryhmät vuosittain, 1995 – vko 42/2025.




Vakava tauti alle 4-vuotiailla ja yli 65-vuotiailla,
nämä ikäryhmät korostuvat sairaalahoidossa liikyyhtä paljon.

l
u
k
u
s



HUS: RSV-potilaat osastohoidossa viikoittain 2023 – vko 40/2025.

RSV-potilaat osastohoidossa viikoittain, Uudenmaan hyvinvointialueet (Lähde: THL), 2025-10-20




HUS:

Adenovirus vko 42/2025 asti,
tapausmäärät ovat lisääntyneet
syyskuussa

HUS ja Suomi: Adenovirus vuosittain, 1995 – vko 42/2025.



Vuonna 2024 erityisesti varuskunnissa oli voimakas kevät- ja syksyepidemia, jälleen tapausmäärät kasvussa syys-lokakuusta alkaen.




HUS: Adenovirus viikoittain


vko 1/2025 – vko 42/2025.



Adenotapaukset ovat lisääntyneet jälleen syyskuusta 2025 alkaen.



HUS: Adenopositiivisten osuus otetuista
hengitystie-PCR-näytteistä, vko 1/2025 – vko 41/2025.
Syyskuusta alkaen adenopositiivisten osuus on ollut kasvussa
(pikkulapsilla ja nuorilla aikuisilla).




HUS: Adenoviruksen ikäryhmät vuosittain, 1995 – vko 42/2025.



Suurin ikäryhmä ovat 15-29-vuotiaat ja alle 4-vuotiaat.

L
ä
r
r
ä
m
u
k
u




HUS:

Legionella vko 42/2025 asti,
maaliskuusta 2025 alkaen
kaupallisiin multatuotteisiin
liittyvä epidemia

HUS ja Suomi: Legionellat vuosittain, 1995 – vko 42/2025 asti.




HUSissa legionelloositapauksia (keuhkokuumeita) eniten 30 vuoteen,
todennäköisenä tartunnanlähteenä kaupalliset multatuotteet/kotikomposti.



HUS: Legionellat kuukausittain,
2010 – vko 42/2025.


Legionelloositapauksia vuonna 2025 eniten kesällä, jatkuen edelleen.



HUS: Legionellan ikäryhmät vuosittain, 1995 – vko 42/2025.




Suurin ikäryhmä ovat yli 45-vuotiaat, alle 14-vuotiailla harvinainen.




HUS:

Mykoplasma vko 42/2025 asti,
vuoden 2024 – 2025 epidemia kesti
9 kuukautta ja loppui vasta
toukokuussa 2025

HUS: Mykoplasma vuosittain, 1995 – vko 42/2025.
Epidemiat noin 5 vuoden välein
(diagnostiikka parantunut ja lisääntynyt).




THL: Tartuntatautirekisteri



HUS: Mykoplasma viikoittain, vko 1/2025 – vko 42/2025.




Viimeisin epidemia kesti 9 kuukautta, ja loppui vasta toukokuun alussa 2025.



HUS: Mykoplasman ikäryhmät vuosittain 1995 – vko 42/2025.



Suurin ikäryhmä ovat 5-29-vuotiaat,
mutta myös keski-ikäisiä on joutunut sairaalahoitoon.




HUS:

Noro vko 42/2025 asti,
epidemia odotetaan alkavan
vasta alkuvuodesta 2026

HUS: Noro vuosittain ja kuukausittain, 2003 – vko 42/2025.




Lievä kevätepidemia 2025 kesti 5 kuukautta ja loppui vasta kesäkuussa.



HUS: Noro kuukausittain, 2018 – vko 40/2025.




Seuraavan epidemian odotetaan alkavan vasta alkuvuodesta 2026.



HUS: Noro viikoittain, vko 1/2025 – vko 42/2025.



Seuraavan epidemian odotetaan alkavan vasta alkuvuodesta 2026.



HUS: Noron ikäryhmät vuosittain, 2003 – vko 42/2025.



Suurin ikäryhmä ovat yli 65-vuotiaat, joista otetaan näytteitä sairaaloissa ja ympärivuorokautisessa asumispalvelussa.

L
u
k
u
s

