

Pernan poisto: aikuisten rokotukset

Pernan poisto (tai pernan toimimattomuus) altistaa kapselillisten bakteerien aiheuttamille infektioille. Tiettyjen kapselillisten bakteerien aiheuttamia infektioita voidaan estää rokotuksin.

Rokotukset aloitetaan sairaalassa potilaan toivuttua toimenpiteestä. Potilasta hoitava erikoissairaanhoidon yksikkö on vastuussa rokotusten aloittamisesta. Potilas ohjataan haakeutumaan terveysasemalle jatkorokotuksiin (ks. potilasohje).

Sairaalassa annettavista rokotteista (Prevenar 20, Menveo, Bexsero, Act-HIB) on Apotissa valmis määräyspaneeli (INF PERNANPOISTOPOTILAAN ROKOTTEET).

1. Pneumokokkrokote

Prevenar 20® (PCV20)

- Ei kuulu kansalliseen rokotusohjelmaan. Hoitava yksikkö maksaa osana hyvää hoitoa.
- Ei tehosteen tarvetta.

2. Haemophilus influenzae b (Hib) -rokote

Act-HIB®

- Ei kuulu kansalliseen rokotusohjelmaan. Hoitava yksikkö maksaa osana hyvää hoitoa.
- Ei tehosteen tarvetta.

3. Meningokokkrokotteet

Kansallisen rokotusohjelman mukaisesti maksuttomia potilaalle ja potilasta hoitavalle yksikölle.

Menveo® (seroryhmät A, C, W, Y)

- Tehosterokote viiden vuoden välein

Bexsero® (seroryhmä B)

- Tehosterokote kerran 1 kk kuluttua ensimmäisestä annoksesta (mahdollisesta jatkotehosteiden tarpeesta ei ole vielä kansallista suositusta).

Muutoshistoria

17.11.2025	Ohje julkaistu
------------	----------------