

Varotoimet ja MRSA-näytteet pistoshuumeiden käyttäjien kohdalla

HUSin alueen suonensisäisiä huumeita käyttävillä on kohonnut MRSA-kantajuuden riski.

Päivystykseen hakeutuvilta suonensisäisiä huumeita käyttäviltä otetaan infektiopesäkkeiden bakteeriviljelyiden ja mahdollisten veriviljelyiden lisäksi **MRSA-seulontanäytteet (tutkimustilaus 4358)** alla luetelluista kohdista yhden kerran. Näytteitä ei oteta, jos edellisistä MRSA-näytteistä on alle kuukausi.

- nenä ja nielu sekä perineum
 - mahdolliset ihorikot ja haavat
 - katetrivirtsat, jos katetri ollut yli viikon
 - muiden katetrien ja dreerien tyvet
-
- Jos potilas jää sairaalahoitoon, hänet sijoitetaan mahdollisuuksien mukaan yhden hengen huoneeseen. Jos tällaista ei ole saatavilla, potilasta hoidetaan [tilavarotoimien](#) mukaisesti.
 - Potilaan hoidossa noudatetaan [kosketusvarotoimia](#), kunnes seulontanäytteet on vastattu negatiivisiksi ja hygieniahoitaja on antanut luvan lopettaa varotoimet. Mikrobilääkitys voi vaikuttaa arvioon.
 - Jos suonensisäisiä huumeita käyttävällä epäillään vaikeaa yleisinfektiota, konsultoidaan infektiolääkärinä mahdollisen MRSA:han kohdistuvan hoidon aloittamisesta.
 - Potilasohje: [Hygieniaohe pistoshuumeiden käyttäjille MRSA-infektioiden ehkäisemiseksi](#)