

Aikuisen anestesiassa tehtävä aneurysmaattisen luukystan hoito

Sinulla on todettu hyvänlaatuinen luumuutos, niin sanottu aneurysmaattinen luukysta.

Röntgenlääkäri hoitaa sen röntgenissä ruiskuttamalla luukystaan lääkeainetta ihon läpi.

Hoito tehdään anestesiassa eli nukutuksessa. Anestesia lääkäri ja anestesiahoitaja valvovat vointiasi toimenpiteen ajan.

Toimenpiteeseen tullessasi ota huomioon:

- Anestesian jälkeen et saa ajaa autoa.
- Pääset kotiin samana päivänä, kuin toimenpide tehdään. Sairaalaan et saa lähteä yksin. Pyydä omainen tai muu tukihenkilö hakemaan sinut.
- Seuranasi on oltava aikuinen omainen tai tukihenkilö seuraavaan aamuun saakka.

Varaa toimenpiteessä käyntiin koko päivä. Toimenpiteen kesto on yleensä 1–2 tuntia. Sen jälkeen vointiasi seurataan vielä heräämössä 1–4 tuntia.

Saapumisohjeessa on yhteystiedot, jos sinulla on kysyttävää toimenpiteestä.

Ennen toimenpidettä

Jos sinulla on käytössä veren hyytymiseen vaikuttava lääke, saat sen ottamiseen erillisen ohjeen yksiköstä, josta sinut lähetettiin toimenpiteeseen.

Aamulla ennen toimenpidettä

- Ota lääkärin määräämät lääkkeet pienen vesimäärän kanssa.
- Älä syö mitään 6 tuntiin ennen toimenpidettä.
- Älä juo 2 tuntiin ennen toimenpidettä. Älä juo edes vettä.

Jos olet yliherkkä puudutteelle tai verisuoneen annettavalle jodivarjoaineelle, kerro siitä, kun tulet sairaalaan.

Toimenpiteen aikana

Ennen toimenpidettä varmistetaan, että toimenpide ja anestesia on turvallista tehdä.

Sinulle laitetaan käteen laskimokanyyli.

Sinut nukutetaan kevyesti, koska toimenpiteen aikana sinun on oltava aivan liikkumatta.

Röntgenlääkäri puuduttaa ihon ja luun pinnan ja laittaa toimenpiteessä käytettävän neulan paikalleen. Sen jälkeen hän ruiskuttaa hoitavan lääkeaineen ja ottaa neulan pois.

Toimenpiteen jälkeen

- Sinut kuljetetaan röntgenistä heräämööseen, jossa vointiasi seurataan. Mahdollisuuksien mukaan omainen tai tukihenkilö voi olla kanssasi.
- Kotiin pääset sitten, kun nukutusaineiden vaikutus on lakannut ja vointisi on hyvä.
- Voit syödä ja juoda normaalisti.
- Toimenpidepäivänä pidä pistoskohta kuivana.
- 3 päivän ajan toimenpiteestä älä sauno, kylve tai ui. Voit käydä suihkussa.

Ota huomioon

Tutkimuksesta ei tule erillistä maksua.

Peru aika, jos et pääse tulemaan. Jos et peru aikaa, sinulta peritään sakkomaksu.